

RESULTADOS DE LAS CONIZACIONES EN MAYORES DE 50 AÑOS.

Sanz Baro, R; Ferreira Borrego, I; Álvarez Gil, C; Pineda Domínguez, L; Blanco Herraiz, I; Albi González, M. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

OBJETIVOS

A pesar de haber superado el pico de incidencia de CIN 2+, las conizaciones en mayores de 50 años no son infrecuentes. Nuestro objetivo es evaluar las lesiones en este tipo de pacientes, así como los resultados del tratamiento escisional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre julio de 2016 y julio de 2017 se realizaron 26 conizaciones en mujeres mayores de 50 años en la unidad de patología cervical del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Se analizaron:

- Edad
- Hábito tabáquico
- Citología, HPV, colposcopia y biopsia al diagnóstico
- AP de conización
- Citología, HPV, y colposcopia a los 6 meses del tratamiento quirúrgico.

RESULTADOS


La edad media fue de 58 años (50-70). El 73,3% tenía una biopsia CIN 2+ prequirúrgica.

La conización diagnosticó CIN 2+ en un 73,1%, con márgenes negativos en un 80,8% (endocervical) y 92,3% (exocervical).

A los 6 meses, se observaron altas tasas de negativización de citología y HPV.

5 pacientes fueron sometidas a histerectomía por margen endocervical afecto.

Se observó una relación estadísticamente significativa entre la citología de alto grado y las lesiones CIN 2+ en la pieza de conización.



CONCLUSIONES

En nuestro centro, las conizaciones en mujeres mayores de 50 años tienen unos resultados adecuados en cuanto a correlación del estudio histológico de la pieza y la citología y biopsia al diagnóstico, una adecuada tasa de márgenes libres y de negativización de citología y HPV postcirugía. Como dato a destacar, y a pesar de una alto porcentaje de colposcopias adecuadas (91,7%), la tasa de márgenes libres fue mayor par el margen exocervical, de forma opuesta a como curre en las pacientes más jóvenes.