

## MANEJO TERAPÉUTICO Y EXTENSIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO INVASOR

Mariano Laguna Olmos, Cristina Fernández García, Laura San Juan Sáenz, Catalina Renata Elizalde Martínez De Peñuela, Valentina Fernández Ladrón, Cristina Tejada Llamas  
Hospital San Pedro (Logroño)


### OBJETIVOS

El tratamiento de elección en el cáncer de cérvix en estadios iniciales ha sido la histerectomía radical durante mucho tiempo aunque en los últimos años se tiende a realizar cirugías más conservadoras, esto junto con la importancia de la presencia de metástasis ganglionares como importante factor pronóstico en relación con la supervivencia de estas pacientes nos ha llevado a realizar este estudio con el objetivo de:

- Analizar el manejo terapéutico de nuestras pacientes.
- Determinar la existencia de metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico.
  - Supervivencia de las pacientes a estudio.

### MÉTODOS Y RESULTADOS



**Estudio retrospectivo descriptivo.  
Mujeres diagnosticadas de Cáncer de Cérvix invasor  
entre 2014-2016 (N=25).**




#### TTO. QUIRÚRGICO.



#### CANDIDATAS A TTO. QUIRÚRGICO VS NO CANDIDATAS



#### NO TTO. QUIRÚRGICO.



- El **52%** presentaban **Metástasis ganglionares** en el momento del diagnóstico, de los cuales el **69.24%** de estirpe **escamosa** y el **30.76%** adenocarcinoma.
- **De las 25 pacientes de nuestra muestra, en el momento del estudio, habían fallecido el 36%.**

### CONCLUSIÓN

El cáncer de cuello de útero es un tumor agresivo, lo que podemos apreciar en nuestro estudio al observarse extensión sistémica en más del 50% de los casos. Este hecho constata la importancia de un adecuado programa de cribado para la detección precoz de esta enfermedad.