

ESTUDIO DE LAS CONIZACIONES REALIZADAS EN NUESTRO CENTRO 2014 - 2015

C. Gajino Suárez ; P. Buyo Sánchez ; L. Aradas Furelos. Hospital Teresa Herrera CHUAC. A Coruña



Analizar características **epidemiológicas, indicaciones, resultados anatomopatológicos y complicaciones** de pacientes sometidas a una conización entre 2014 y 2015 en nuestro Hospital.

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de 703 conizaciones

Resultados

Edad media: 39 años

46% Nulíparas

4,6 % Inmunodeprimidas

Más del 95% presentaban un VPH positivo de alto riesgo:
VPH 16 + 34%

Indicación principal :H-SIL 89% (L-SIL persistente 11%)

95% Legrados endocervicales negativos

77% Bordes quirúrgicos libres, 23 % con proximidad o afectación

99% sin complicaciones intraoperatorias

Complicaciones postquirúrgicas muy escasas: Sangrado 6%, Dismenorrea por estenosis del canal 4%

7% de las pacientes precisaron ser reintervenidas: Reconización 6%, Histerectomía 1%

Conclusiones

La indicación principal es la presencia de una displasia de alto grado

Un 95% presentaban positividad en la detección de serotipos de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano, siendo el más frecuente en nuestra serie el VPH 16.

La mayoría fueron pacientes en la edad media de la vida sin una inmunidad comprometida

En las mujeres inmunodeprimidas la afectación de los márgenes quirúrgicos y del endocérnix fue más prevalente y por tanto tuvieron que ser reintervenidas con más frecuencia

En la mayor parte no hubo complicaciones intraoperatorias ni post-quirúrgicas.