

ÚLCERA VULVAR YATROGÉNICA

Sanz Baro, R; Pérez García, L; Orozco Fernández, R, Ferreira Borrego, I; Álvarez Gil, C; De la Torre, E. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Presentamos el caso de una úlcera vulvar iatrogénica.

Se trata de una mujer de 39 años, a la que en 2012 se realizó una artroplastia de cadera izquierda y en 2013 fue intervenida de nuevo por una tendinitis de iliopsoas en la misma cadera.

Un mes después, vuelve a ser intervenida, y se realiza una nueva artroscopia de cadera para acetabuloplastia y sinovectomía sin complicaciones.

La cirugía tuvo una duración de dos horas durante las cuales, la paciente permaneció en decúbito lateral con la cadera izquierda en tracción, abducción, rotación y ligera flexión.

Para ello, se utilizó un cilindro recubierto por almohadillas de protección colocado entre ambos miembros.



Siete horas tras la cirugía, la paciente presentó eritema y edema vulvar con ampollas y úlceras en relación con la presión sobre el área genital. Se colocó sonda vesical permanente y las lesiones desaparecieron a lo largo de un mes, con tratamiento conservador por parte de dermatología.



Un año después, consulta por vulvodinia en relación con gran cicatriz vulvar. Presentaba cicatrices queloideas induradas, de 3cm en el lado derecho del monte de venus y de 2cm en el labio mayor derecho. Se resecaron ambas formaciones con buena evolución y correcta cicatrización.



Las complicaciones no traumatológicas de la artroscopia de cadera son infrecuentes (0,5-6%) pero potencialmente graves por lo que se debe extremar su prevención.