

REVISIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD EN LA TÉCNICA DE CONIZACIÓN: REVISIÓN CASUÍSTICA EN NUESTRO

Ullmo Prion.J, Pedró Carulla.R, Ayats Caminade.A, Cruz Picado.N, Salinas Peña.J, Cavallé Busquets.P
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus.

Introducción:

La acreditación de calidad tiene una demanda creciente en la industria de la salud. Cada vez más se requiere certificación para evaluar si un servicio médico posee las habilidades y los conocimientos requeridos para un desempeño exitoso de su actividad. La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) marca ciertos parámetros de calidad que se deberían tener en cuenta a la hora de realizar una consulta de patología cervical y en particular en mujeres conizadas.

Objetivos:

- Observación y análisis de los resultados con miras a mejorar la calidad
- Comparaciones de acuerdo a las referencias existentes establecidas por la AEPCC

Metodología:





Estudio observacional descriptivo retrospectivo del año 2016 .
Mujeres diagnosticadas de H-SIL y tratadas por conización en el año 2016 y en seguimiento en nuestro centro hasta el año 2018.
Se revisaron diferentes parámetros de calidad establecidos por la AEPCC.
Se examinó la correlación entre los resultados citológicos y los resultados anatomopatológicos, la relación entre la persistencia de infección por VPH con los márgenes afectados y la persistencia de lesión a los 6 y 24 meses de seguimiento.
Se incluyó también el número de conizaciones realizadas en consultas y en quirófano así como la proporción de mujeres vacunados post-tratamiento

Conclusión:

La mayoría de los resultados obtenidos en nuestra consulta de patología cervical en mujeres conizadas se asemejan a los establecidos por la AEPCC y las sociedades europeas.
Esta revisión nos permite tener un enfoque crítico en cuanto a nuestra asistencia en las consultas de patología cervical. Somos conscientes de que tenemos que mejorar en ciertos ámbitos con tal de poder ofrecer a nuestras pacientes el mejor cuidado.

Resultados:

Un total de 57 mujeres conizadas fueron incluidas en esta revisión de las cuales 53 se realizaron en consultas y 4 en quirófano.
Los resultados citológicos y los resultados anatomopatológicos se correlacionaron en un 84%.
La persistencia de VPH se relacionó en un 44% con la afectación de ambos márgenes cervicales.
La mayoría de pacientes no presentaron persistencia ni recurrencia de las lesiones a los 6 y 24 meses de seguimiento post-conización.



	Nuestro centro	Recomendación AEPCC
Conizaciones ambulatorias	93%	>70%
Conizaciones con lesión >HSIL/CIN2	84%	>70%
Conizaciones con márgenes positivos	40%	<20%
Conizaciones con margen endocervical afectado	18%	<20%
Persistencia/recurrencia de lesión >HSIL/CIN2 a los 6 meses	9%	<10%
Persistencia/recurrencia de lesión >HSIL/CIN2 a los 24 meses	2%	<5%
Vacunación VPH en mujeres conizadas	19%	>90%

Tabla comparativa con resultados AEPCC