

Prevención primaria y secundaria del VPH. ¿Qué saben nuestros residentes?

Martínez Molina, C; Domínguez García, C; Díez- Madroñero Cendrero, L; Caminero Durán, M; Loira Calvar, T; Gutiérrez Montalbán, I.
Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres)

Objetivos:

Exponemos los resultados de un estudio descriptivo transversal, cuya razón es saber el grado de conocimiento de los residentes de nuestro complejo hospitalario sobre la prevención primaria y secundaria del VPH, así como, determinar la cobertura vacunal en esta población.

Material y métodos:

Encuesta realizada de forma online, la cual consta de 25 preguntas acerca del estilo de vida, conducta sexual y conocimiento sobre el VPH. Se envió mediante correo electrónico aportado por la unidad docente a MIR, EIR, FIR y PIR.

Resultados:

Hemos obtenido 66 cuestionarios cumplimentados (50 %). La media de edad es 27 años. Un 69'7 % son mujeres. El 81'1 % son médicos internos residentes.

El porcentaje de fumadores fue de 16'7 %. Sobre la conducta sexual, el 95'5 % se considera heterosexual, el 74'2 % afirma tener pareja estable y reconocen más de 3 parejas sexuales a lo largo de su vida. En cuanto al uso de anticoncepción, el 90'9 % asegura emplearlo, siendo el método barrera el más utilizado, seguido de la anticoncepción hormonal oral.

Incluimos una serie de preguntas sobre la prevención secundaria del HPV. El 97 % conoce su relación con el cáncer de cérvix, útero, vagina, vulva, pene, ano, laringe y orofaringe. El 98'5 % indican que la citología es el método de cribado actual. No obstante, solo el 39'4 % saben cual es la edad de inicio del cribado. Un 50 % desconoce la periodicidad del cribado y un 33 % no sabe precisar la edad de finalización del mismo. Un 21'2 % de las mujeres encuestadas no realiza correctamente el cribado. El 100 % afirman conocer la existencia de la vacunación frente al VPH, pero solo el 31'8 % aseguran estar vacunados. El 97 % están a favor de la inclusión de los varones en el calendario vacunal.



Conclusiones:

Concluimos que si bien nuestros residentes son conscientes de las implicaciones del VPH, solo el 39'4 % conocen las recomendaciones actuales del inicio del cribado. El 21 % de las encuestadas reconocen no cumplir el cribado, siendo la cobertura vacunal en esta población del 68'1 %. Hemos obtenido menos respuestas de las esperadas, que interpretamos como una falta de interés en el tema. . En un futuro, nos gustaría conocer las causas del no cumplimiento del cribado. Sería relevante una propuesta de mejora en la formación y actualización de nuestros residentes sobre el VPH y su prevención.