

RELEVANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PACIENTES CON PERSISTENCIA/RECURRENCIA VIRAL: DESCRIPCIÓN DE NUESTROS RESULTADOS.

Marta Pérez Febles, María López Pais, Carmen Elena Badillo Bercebal, Rosa María Dos Santos Díaz, Victoria Pascual Escudero, Susana Cortés Pérez.
Facultad de Medicina de Valladolid. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

OBJETIVOS:


- Conocer la tasa de persistencia del VPH en nuestras pacientes conizadas.
- Analizar que factores predisponen dicha persistencia.

MATERIAL Y MÉTODOS:

TIPO DE ESTUDIO	• Observacional, descriptivo y retrospectivo .
MUESTRA	• 100 pacientes conizadas
PERIODO	• Mayo 2016-enero 2019
VARIABLES	• Edad • Genotipo viral (pre y postquirúrgico a los 6 meses) • Tabaquismo • Uso de método de barrera • Vacunación • Estado de los Márgenes • Cambios colposcópicos
FUENTE	• Base de datos de la Unidad e historias clínicas de las pacientes

RESULTADOS:

CONCORDANCIA VPH PRE Y POSTCONIZACIÓN




- Persistencia viral
- Recurrencia
- Infectaron / reactivaron nuevos genotipos

- Estudio anatomopatológico de los márgenes quirúrgicos de la pieza de conización, 32% tenían algún margen afecto (16% endocervical)
- Edad media en grupo de persistencia: 39.2 años
- Prevalencia genotipos virales VPH pre-conización: 16 (38,46%), seguido de 31,35,18.

FACTORES DE RIESGO	PORCENTAJE PRECONIZACIÓN	PORCENTAJE POSTCONIZACIÓN
Uso método barrera	15,4%	76.9%
Fumadoras	61,5%	53.8%
Vacunación	15.38%	92.30%

6 MESES TRAS CONIZACIÓN



CONCLUSIONES:

- Los resultados obtenidos evidencian un alto grado de concordancia entre los factores de riesgo y la recurrencia/persistencia tras la conización.
- Es de gran importancia la promoción de la salud en la población, para corregir los factores de riesgo modificables (53,8% fumadoras y 24% no utilizaban método de barrera).
- Un 13% del total de nuestras pacientes conizadas en este periodo, presentaron persistencia/recurrencia viral VPH, lo que se encuentra en concordancia con los estándares de calidad propuestos por la AEPPCC (<10%)
- En conclusión, la determinación viral permite conocer los genotipos más persistentes y con mayor recurrencia, permitiéndonos adecuar el seguimiento de dicho resultado.
- La vacunación en población tratada por lesiones relacionadas con VPH es financiada actualmente por el Sistema Nacional de Salud, dado que ha demostrado disminuir la infección y podría evitar reinfección o nuevas infecciones de los genotipos incluidos.