



ANALISIS DESCRIPTIVO DE UNA MUESTRA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VaIN

De Diego Yenes M., Rando Zalduendo D., Iza Larraona Ane., Aiartzaguena A., Otero B., Díez García, J.

- Objetivos:

Analizar los principales factores de riesgo y antecedentes comunes en las pacientes con VaIN en nuestro medio, así como las diferentes opciones terapéuticas que pueden ser llevadas a cabo, para intentar observar correlación con la literatura científica publicada y poder identificar pacientes susceptibles de padecer dicha patología.

- Métodos:

Análisis descriptivo de 7 pacientes diagnosticadas y tratadas de VaIN en el Hospital Universitario Cruces entre los años 2014 y 2019.



- Resultados:

El 100% de las pacientes analizadas tenían antecedentes de patología cervical (CIN III o carcinoma invasivo de cérvix).

En el 100% de los casos se identificó infección por VPH, siendo el serotipo 16 hallado en el 57% de las pacientes.

En nuestro centro, la opción terapéutica de primera línea fue la colpectomía parcial, realizándose en 5 de las 7 pacientes.

En cuanto a las dos pacientes restantes, una de ellas rechazó el tratamiento y la otra fue tratada con braquiterapia de inicio, tras haberse desestimado la cirugía por imposibilidad técnica.



- Conclusiones:

Estos datos parecen reflejar la relación entre un antecedente de lesión cervical y la posibilidad de desarrollar segundas neoplasias o lesiones precancerosas asociadas a VPH a otros niveles.

En este sentido, si bien a nivel poblacional no está indicado el cribado rutinario de lesiones vaginales, la presencia de estas segundas lesiones justifican la extensión del cribado citológico hasta 20 años tras el tratamiento de una lesión cervical.

La disponibilidad de diferentes opciones terapéuticas en cada centro, puede condicionar el tratamiento realizado.