



ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ACLARAMIENTO VIRAL: EDAD, TABAQUISMO, SEROTIPOS, Y VOLUMEN DE LA RESECCION

Ana Vázquez del Campo; Maddalen Martinez Dolara; Elena Prieto Ruiz; Ainhoa Campo Careaga; Alazne de Castro Momoitio; Diego Erasun Mora





El 53% de las menores de 35 años, el 57% de las mujeres entre 35 y 45 años y el 48% de las mayores de 45 años lograron aclaramiento viral, **sin ser estas diferencias estadísticamente significativas.**



El 28% de nuestras pacientes son fumadoras, y el 36,8% no lo son. Cabe destacar, que en un 35% de las pacientes no se ha recogido este dato
Las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas

- ❑ **Objetivo** → determinar que factores pueden estar implicados en el aclaramiento viral tras la técnica.
- ❑ Recogida de datos retrospectiva longitudinal de pacientes en los que se realizó Lletz entre los años 2016 y 2019.
- ❑ Muestra de 478 pacientes, con una media de edad de 41 años ,siendo el 72% de ellas mayor de 35 años. En cuanto a los controles posteriores, el 53% de las pacientes han tenido un aclaramiento del HPV en el primer estudio.




En cuanto al volumen de resección:

- EL 60% fue > 2cm3
- EL 21.6% fue >1cm3 y <2cm3
- EL 18,4% restante fue < 1cm3

Respectivamente el % de aclaramiento fue:

- 54%
- 43%
- 56%

Las diferencias encontradas no fueron estadísticamente significativas



El 46% de las lesiones producidas por el serotipo 16, el 55% de las producidas por el 18 y el 56% de las lesiones producidas por el resto de serotipos logran el aclaramiento viral, **sin ser estas diferencias estadísticamente significativas.**

CONCLUSIONES

- El 53% de nuestras pacientes logran aclaramiento viral tras la técnica escisional, solo en un 23% persiste la infección por el mismo serotipo.
- Respecto a los factores analizados no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al aclaramiento viral, y en general nos movemos en porcentajes de aclaramiento similares, entre un 43 y un 57%.
- Cabe destacar que en nuestra muestra, el volumen de la pieza del Lletz no parece que influya de manera significativa en el aclaramiento viral, lo cual podría influir en el futuro, haciéndonos cada vez más conservadores, en especial en mujeres con deseo gestacional.