

EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO (L-SIL) DE CÉRVIX: ESTUDIO RETROSPECTIVO

Laura Millán de la Pinta, Lucía Serrano, Daniel Andia Ortiz, Andrea Ilarri Urabayan, José Cruz Quílez Conde, Marta Silvia Legorburu Díaz.

OBJETIVO

Conocer la **evolución** que presentan las lesiones intraepiteliales de bajo grado (L-SIL) de las pacientes de la Unidad de Patología Cervical del Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.


Determinar las lesiones que regresan, persisten o progresan y conocer los **factores implicados** en dicha evolución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio:

- Retrospectivo
- Observacional
- Descriptivo
- Longitudinal
- No controlado



Pacientes con **L- SIL** en la biopsia colposcópica durante el año 2014 en el **Hospital Universitario de Basurto**



Excluidas 125 pacientes:

- 30 pacientes fueron diagnosticadas al mismo tiempo de una lesión histológica L-SIL/CIN 1 y de una lesión histológica H-SIL/CIN 2-3.
- 72 pacientes por presentar la lesión L-SIL en una pieza de conización o de histerectomía quirúrgica.
- 3 pacientes en seguimiento con anterioridad por una lesión L-SIL.
- 6 pacientes hubo discordancia entre la citología (H-SIL/CIN2-3), la colposcopia y la biopsia diagnóstica (L-SIL/CIN1).
- 14 pacientes no acudieron a más citas.

RESULTADOS



- Hábito tabáquico: **factor de riesgo**

- Asociación entre la citología H-SIL/ASC-H al inicio del estudio y el posterior desarrollo de H-SIL: **factor de riesgo** (no se alcanza significación estadística).
- Pareja sexual estable y uso de preservativo: **factores protectores** (no se alcanza significación estadística).
- No se encontraron diferencias teniendo en cuenta el número de gestaciones ni la vacunación frente a VPH

CONCLUSIONES

Manteniendo un manejo expectante de las lesiones L-SIL, la mayoría (69,6%) regresan de forma espontánea.

El hábito tabáquico produce un mayor riesgo de progresión de las lesiones.

Otros factores parece que actúan como **factores protectores** de evolución de estas lesiones a H-SIL, sin llegar a alcanzar la significación estadística.