



ANÁLISIS DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS PACIENTES CONIZADAS EN NUESTRA UNIDAD

Miserachs Sala, Marta. Calveras Auge, Joana. Hinojosa Sánchez, Lourdes. Grané Garcia, Núria.
Fundació Althaia. Xarxa Universitària de Manresa


OBJETIVOS

Análisis de datos epidemiológicos de las pacientes conizadas y en seguimiento por nuestra unidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión retrospectiva de **201 pacientes conizadas y en seguimiento por la Unidad de Patología Cervical de ASSIR Bages de Manresa de 2015-2018**. Se obtienen los datos de la primera visita realizada en nuestra unidad y de los controles posteriores

RESULTADOS




Edad media
42,2 años




80% edad fértil


27.36% nulíparas
24.88% primíparas
30.35% secundíparas
16.42% múltiparas




Vacunación post
procedimiento



Seguimiento cribaje CCU




Indicación conización



80,59% LESIÓN EXOCERVICAL

Correlación anatomopatológica



CONCLUSIONES

- En el 5,97% de las pacientes no se detecta evidencia de displasia en la pieza de conización. En el grupo de pacientes conizadas por biopsia previa de displasia de alto grado, existe una correlación del 81,66% entre esta y el resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Ambos resultados son acordes a los estándares de calidad.
- Se detecta un aumento del interés por la vacunación contra el HPV des del 2015. En el período 2017-2018, el 52% de las pacientes se administraron alguna de las vacunas disponibles post procedimiento. En los próximos años será interesante evaluar la influencia de la vacunación en los resultados post conización de las pacientes vacunadas