


TRATAMIENTO MÉDICO DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES ESCAMOSAS DE ALTO GRADO (HSIL): CAMBIANDO EL PARADIGMA.

Autores: Y.L. Santana Mateo, E.P. Escamilla Galindo, N.F. Medina Ramos, M. Armas Roca, L. León Arencibia, L. Molero Sala.
Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior. Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil de Canarias.



ANTECEDENTES / OBJETIVOS

Las posibles complicaciones de la escisión quirúrgica y la estabilidad de las lesiones intraepiteliales a lo largo del tiempo justifican un tratamiento conservador de estas lesiones. El tratamiento con **imiquimod** representa uno de los agentes más prometedores en el tratamiento conservador de HSIL.

OBJETIVO : Analizar los resultados del tratamiento de las HSIL con **imiquimod** en mujeres jóvenes sin deseo genésico cumplido.

MÉTODOS

ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO

Enero de 2010 – Abril de 2019

CRITERIOS INCLUSIÓN



- Mujeres jóvenes sin deseo genésico cumplido
- Diagnóstico citológico y/o histológico de HSIL
- Colposcopia adecuada, satisfactoria y lesiones periféricas limitadas sin compromiso endocervical
- Posibilidad de seguimiento



Obtención de Consentimiento informado

RESULTADOS




78 PACIENTES

Edad media = 26,9 años (17-45)


Edad 1º contacto sexual: 16,2 años (rango 13-23)

Motivo de remisión a UPTGI




Edad 1º relación sexual (años)	16,2 (13-23)	
Número parejas sexuales	6,1 (1-20)	
Partos previos	SI	12 (15,4%)
	NO	66 (84,6%)
Tabaco	SI	21 (26,9%)
	NO	57 (73,1%)
Método anticonceptivo	Anticoncepción hormonal	33 (52,4%)
	DIU	5 (7,9%)
	Preservativo	25 (39,7%)

Diagnóstico de la HSIL




HPV al diagnóstico



Número medio de dosis recibida = 4,9 (1-11)

Respuesta al tratamiento



Se consideró respuesta al tratamiento:

Disminución del grado lesional (bajo grado)
Cito/Histología negativa y HPV positivo
Cito/Histología negativa y HPV negativo



El **imiquimod** es una opción terapéutica para lesiones HSIL **eficaz y tolerable** en pacientes jóvenes sin deseo genésico cumplido que permite **disminuir el grado lesional** y la posibilidad de **evitar o aplazar el tratamiento quirúrgico** sobre el cérvix.

CONCLUSIONES