



¿LA ADMINISTRACION DE OVULOS VAGINALES PREVIENE LAS COMPLICACIONES TRAS TRATAMIENTOS ESCISIONALES EN NUESTRA MUESTRA? ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

Autores: Ana Vázquez del Campo; Alazne de Castro Momoitio; Ainhoa Campo Careaga; Maddalen Martinez Dolara; Diego Erasun Mora; Elena Prieto Ruiz

OBJETIVOS, MATERIAL Y MÉTODOS

- Determinar el porcentaje y tipo de complicaciones halladas en nuestra muestra
- Determinar si la administración de tratamientos vaginales previene la aparición de complicaciones hemorrágicas tras técnicas escisionales para proponer en nuestro centro su administración generalizada a todas las pacientes.



- ❖ Recogida de datos retrospectiva longitudinal.
- ❖ Muestra de 478 pacientes, en las que se realizó un Lletz entre 2016 y 2019
- ❖ Según criterio médico a 253 pacientes no se les administró tratamiento, a 114 pacientes se les administraron probióticos vaginales durante 7 días y a 49 pacientes se les trató con óvulos de clorhexidina/ácido hialurónico durante 10 días.
- ❖ Se recogieron las complicaciones hemorrágicas agrupadas en 4 categorías: Nitrato de plata en urgencias / Ingreso con taponamiento/ Cauterización en Quirófano/Sutura en corona en quirófano. 28 Pacientes fueron perdidas.



CONCLUSIONES

-Únicamente **el 7.5% de las pacientes presentan complicaciones hemorrágicas**. **El 5.1% se resuelven en urgencias** y **solo el 2.4% precisan ingreso**. Lo cual se corresponde con el porcentaje de complicaciones hemorrágicas descritas en la literatura (0-8%)

-Los resultados en cuanto a complicaciones hemorrágicas en ausencia de tratamiento y en presencia del mismo son similares, **y las diferencias encontradas no han resultado estadísticamente significativas**. Son precisos más estudios con tamaños muestrales mayores y/o ensayos aleatorizados para determinar la utilidad de la administración generalizada de dichos tratamientos.



Óvulos clorhexidina y ácido hialurónico

