

ENFERMEDAD DE PAGET PERIANAL Y ADENOCARCINOMA DE CUELLO UTERINO

Gutierrez Salas, N.; Gonzalez Lopez, AB.; Villar Jimenez, R.; Moreno Selva, RLL.; Oliva Garcia, AB.; Serna Torrijos, MC.

La Enfermedad de Paget extramamaria supone sólo un 6.5 % de todos los diagnósticos de Enfermedad de Paget, y dentro de la enfermedad extramamaria la localización vulvar es la más frecuente, alcanzando un 65 % de esta forma de presentación. Nuestro caso se trata de una Enfermedad de Paget extramamaria perianal, en la que hay que descartar neoplasia a distancia de recto, gástrica, mamaria o uretral. Lo que llama la atención de este caso es que la extensión ha sido a nivel del canal endocervical, más frecuente en la Enfermedad de Paget extramamaria vulvar.

Se trata de una mujer de 63 años diagnosticada de Enfermedad de Paget extramamaria perianal que ha tenido varias intervenciones para extirpación de lesiones y reconstrucción por parte de los cirujanos plásticos y los dermatólogos a través de la cirugía de Mohs. En seguimiento por Servicio de Digestivo aportando gastroscopia y colonoscopia normales.

Dermatología solicita exploración ginecológica de control, encontrándose la paciente asintomática. En dos ocasiones se ha realizado mapeo vulvar en quirófano en busca de neoplasias adyacentes siendo negativo en ambos episodios. En esta ocasión se realiza también estudio citológico y colposcópico ante la recidiva de las lesiones, sobre todo, a nivel perianal.

El resultado de la citología de cuello uterino es sugestiva de adenocarcinoma. El legrado endocervical informa de extensión de Enfermedad de Paget y la biopsia cervical infiltración intraepitelial por Enfermedad de Paget. También se toman biopsias de vulva y ano que llegan positivas para infiltración. La biopsia de endometrio muestra un fragmento de mucosa atrófica.

Ante estos resultados se deriva a la paciente a la unidad de ginecología oncológica de nuestro hospital de referencia.

La conclusión de este caso es que aunque el despistaje principal de la Enfermedad de Paget extramamaria perianal sea en otras localizaciones, en una mujer incluso asintomática ginecológicamente también debe buscarse neoplasias a nivel del aparato genital.

