



AFECTACIÓN DE MÁRGENES DE PIEZAS DE CONIZACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES



González Fadrique M.N., Moscairo Cora D.F., Rodríguez Puente R., Zancajo Benito A., Díaz Miguel V.
Servicio de Ginecología. UPC. Hospital Universitario del Henares. Coslada.Madrid

Objetivo

En metaanálisis se ha demostrado que tras una conización cervical realizada por neoplasia intraepitelial sea cuál sea el grado, existe mayor riesgo de enfermedad residual o recidiva cuando los márgenes de las piezas de conización están afectados que cuando están libres de lesión.

Teniendo en cuenta esto , el objetivo de nuestro estudio es valorar el estado de las conizaciones realizadas en el Hospital universitario del Henares desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018 para valorar si es posible una mejora en la técnica realizada.

Material y métodos:




Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las conizaciones realizadas entre el 1/1/2017 al 31/12/2018.

Se revisaron las historias de las pacientes comprobando el resultado anatomopatológico de las piezas obtenidas tras la conización.

En total de realizaron 115 conizaciones (61 en 2017 y 54 en 2018) .Se realizaron todas en quirófano bajo anestesia raquídea o sedación y todas con asa de diatermia.

La media de edad fue 37,1años(24-69).

Resultados:



Conclusiones

El estado de los márgenes quirúrgicos es un factor de riesgo para la persistencia o recurrencia de lesión por virus del papiloma humano (HPV).

Nuestro porcentaje de márgenes afectados es del 16,51% y dentro de las conizaciones con márgenes afectados lo que más frecuentemente queda afectado es el borde endocervical , no obstante se ha mejorado bastante pues partíamos de series de conizaciones con márgenes afectados de hasta un 28% con afectación endocervical de un 61%.

Una posible solución sería valorar la realización de LEC antes de la conización y según el resultado realizar el cono algo más profundo si estuviese afectado.