

FACTORES PREDICTORES DE PERSISTENCIA/RECURRENCIA EN PACIENTES SOMETIDAS A CONIZACIÓN POR LESIÓN ESCAMOSA INTRAEPITELIAL

Autores: Y.L. Santana Mateo; E. Quevedo Gutiérrez; E.P; Escamilla Galindo; L. Maya Merino ; M. Andújar Sánchez; N.F. Medina Ramos.

Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior. Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil de Canarias. * Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. Universidad de Las Palmas de G.C.



ANTECEDENTES / OBJETIVOS

Tras el tratamiento quirúrgico de las lesiones preinvasoras del cérvix puede persistir la infección por el Virus del Papiloma Humano en un importante porcentaje de pacientes.

MÉTODOS

OBJETIVO :

Analizar si existen factores predictores de persistencia/recurrencia tras la realización de una conización.

ESTUDIO DESCRIPTIVO
RETROSPECTIVO

838 CASOS PACIENTES
CON CONO LLETZ

Enero de 2014 - Diciembre de 2018


EXCLUIDOS:

- Cáncer invasor
- Histología negativa

VARIABLES

- EDAD
- PARIDAD
- NÚMERO PAREJAS SEXUALES
- EDAD 1º RELACIÓN SEXUAL
- HÁBITO TABÁQUICO
- VACUNACIÓN HPV

- HISTOLOGÍA
- ESTADO DEL MÁRGEN
- TIPO DE MÁRGEN AFECTO
- FRAGMENTO DE CANAL



Se consideró PERSISTENCIA / RECURRENCIA -> presencia de HPV a los 6 y 12 meses.

RESULTADOS

838 CASOS PACIENTES
CON CONO LLETZ


559 PACIENTES (67%)
MÁRGENES LIBRES

279 PACIENTES (33%)
MÁRGENES AFECTOS

No diferencias en tipo de virus, los hallazgos colposcópicos previos, el resultado histológico y la afectación del fragmento de canal

Se encuentra asociación con el estado del margen y la afectación del fragmento de canal, resultado histológico y hallazgos colposcópicos previos.

Regresión logística -> la variable más asociada a la persistencia es la asociación de HPV 16/18 con otros virus de alto riesgo.



CONCLUSIONES

El factor relevante independiente que contribuye a la persistencia de la infección HPV tras la realización de una conización es la presencia de **HPV 16/18 asociada a otras variantes.**

