



CRIBADO CITOLÓGICO DE ATIPIA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO INCIERTO Y SU DESENLACE

Luisa Gil Guillén, Juan Martín Viteri Estévez, Almudena Lera Ramírez, Daniela Carolina Méndez Guevara, Adriana Carolina Acha Salazar, Marta García Yuste
HOSPITAL RÍO HORTEGA DE VALLADOLID

OBJETIVOS

En 1998 fue descrita por primera vez la atipia de células escamosas de significado incierto por Bethesda. Desde entonces se utiliza en la terminología actual la categoría de células escamosas atípicas para describir algunas de las citologías con alteraciones que no cumplen criterios de lesiones premalignas.


En este trabajo se pretende analizar los resultados finales de estas alteraciones citológicas tan inespecíficas.

MATERIAL Y MÉTODO


Estudio observacional descriptivo transversal, usando para ello una base de datos en la que se recogen las citologías derivadas desde el cribado poblacional y analizándola con el programa estadístico SPSS. Se escogieron al azar 134 pacientes derivadas por citología con ASC (tanto ASC-US como ASC-H). Se ha estudiado el seguimiento realizado en estas pacientes y el desenlace final de su patología.

RESULTADOS

ASC-US		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	81	78,6	78,6	78,6
	CIN 1	15	14,6	14,6	93,2
	CIN 2	5	4,9	4,9	98,1
	CIN 3	2	1,9	1,9	100,0
	Total	103	100,0	100,0	



ASC-H		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	7	22,6	22,6	22,6
	CIN 1	9	29,0	29,0	51,6
	CIN 2	3	9,7	9,7	61,3
	CIN 3	10	32,3	32,3	93,5
	Carci noma	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	



CONCLUSIONES

Dentro de la determinación citológica de ASC-US se esconden lesiones de alto grado que precisan de un seguimiento estrecho para ser tratadas a la mayor brevedad posible. En nuestro estudio de objetiva una clara relación entre las alteraciones de células escamosas con HPV de alto grado y las lesiones premalignas durante el seguimiento.