

PATOLOGÍA ANAL, VULVAR Y VAGINAL, EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDAS

R3, Kristian Rubio, Rafael José Navarro, Leticia Muñoz, Carmen Bellido, Cecilia Villalain, Victoria Bravo

OBJETIVOS:

La inmunosupresión (IS), ya sea por infección por VIH o por los tratamientos en trasplantes y enfermedades reumatológicas, disminuye la habilidad de erradicar la infección por HPV y aumenta su replicación en células infectadas. Si bien esto ha sido ampliamente estudiado a nivel de patología cervical, **su evolución es menos conocida a nivel anal, vulvar y vaginal.**

MATERIAL Y MÉTODOS:

Presentamos un estudio descriptivo sobre una cohorte de 309 pacientes, 159 con tratamiento IS para control de enfermedades reumatológicas o trasplante, y 150 con diagnóstico de VIH en seguimiento en la consulta de IS de la Unidad Patología Cervical de nuestro centro entre 2009 y 2018. El seguimiento fue anual en ausencia de patología y según los protocolos AEPCCC si enfermedad por HPV

309 pacientes IS

159 no
VIH 150 VIH+

RESULTADOS:

La media de edad fue de 47.7 años. Sólo 14(4,5%) habían recibido algún tipo de vacuna para HPV. Respecto a otros factores de riesgo, el 34.88% eran fumadoras, 15% exfumadoras, 22% habían sido diagnosticadas de alguna ETS y el 27.1% no tenían pareja estable.

PATOLOGÍA PRESENTADA POR NUESTRAS PACIENTES IS	Nº	%
ANAL, de las cuales:	107	34,6
ASCUS	80	74,7
AIN1 / AIN2	2/2	1,9/1,9
ASCUS / AIN1: Tratamiento inicial expectante	82	100
AIN2: Tratamiento inicial: fulguración láser	2	100
VULVAR, de las cuales:	39	12,6
HPV+ (hibridación PCR)	28	71,5
VIN1 / VIN2	33/1	84,6 / 2,6
VIN3 / Ca Vulvar	3/2	7,7 / 5,1
VAGINAL, de las cuales:	20	6,5
HPV+ (hibridación PCR)	20	100
VAIN2 / VAIN3	2/7	10 / 35
Tratamiento inicial: Escisión quirúrgica	13	66,7
Recurrencia amplia (tratada mediante braquiterapia)	7	33,3

CONCLUSIONES:

La tasa de patología vulvovaginal y anal por HPV parece **superior a la de la población general** si bien es difícil de evaluar dada la ausencia de cribado en este segundo grupo. Se debe prestar especial atención al **seguimiento** de esta ya que las tasas de **recurrencia son especialmente altas**, especialmente a nivel **vaginal.**