



RELACIÓN ENTRE LA VACUNACIÓN Y LA PROGRESIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Luisa Gil Guillén, Almudena Lera Ramírez, Juan Martín Viteri Estévez, Katia María Pavón Sáenz, Andrea Solé Mayoral, Marta García Yuste.
HOSPITAL RÍO HORTEGA DE VALLADOLID



OBJETIVOS

Sabemos el beneficio de la vacunación del VPH, pero, ¿lo saben nuestras pacientes? ¿Hasta dónde llegamos al transmitir información? Pese a llevar varios años con campañas de promoción de la salud de la mujer aún son muchas las no vacunadas frente a este virus tan presente en nuestra sociedad. ¿Qué ocurre con las generaciones previas a la inclusión de la vacuna en el calendario vacunal español?

Se pretende analizar cuántas de nuestras pacientes derivadas del cribado de citologías están vacunadas, si fuman y si inician vacunación tras aconsejárs

RESULTADOS

VACUNADAS	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos				
NO	91	88,3	88,3	88,3
SÍ	12	11,7	11,7	100,0
Total	103	100,0	100,0	



LESIÓN		FUMADORA		Total
		NO	SÍ	
LESIÓN	No	55	26	81
	CIN 1	9	6	15
	CIN 2	4	1	5
	CIN 3	1	1	2
Total		69	34	103

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional descriptivo transversal, usando para ello una base de datos en la que se recogen las citologías derivadas al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid desde el cribado poblacional con resultado de ASC-US y analizándola con el programa estadístico SPSS.

CONCLUSIONES

Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas al relacionar la vacunación con el menor número de lesiones de cérvix. No parece haber significación estadística al relacionar tabaco y lesiones causadas por el VPH en nuestra muestra. De nuestro estudio se obtiene la reflexión de que debemos hacer especial hincapié en la prevención primaria contra el VPH en las generaciones que no han entrado en la vacunación por calendario vacunal.