

LEUCOPLASIA VULVAR. A PROPÓSITO DE UN CASO

Marín Martín L; Martín Bustos A; Azpeitia Rodríguez M; Molpeceres Martínez I; Posadilla Andrés V; López Menéndez Arqueros M.

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Río Carrión (Palencia)

- **ANTECEDENTES PERSONALES**: Mujer de 92 años de edad, HTA, fibrilación auricular y portadora de prótesis aórtica.
- **ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS**: MP a los 50 años; 5 partos eutócicos. Valorada por prolapso uterino a los 80 años, desestimó tratamiento.
- **MOTIVO DE CONSULTA**: Bulto en genitales y sangrado de origen ginecológico.
- **EXPLORACIÓN FÍSICA**: Prolapso uterino total con formación excrecente blanquecina, friable, de aspecto polipoideo y sólida a nivel externo, que impide distinguir OCE
- **RESULTADO**: Se realiza biopsia cervical para descartar malignidad. Informada como hiperplasia de células escamosas ectocervicales. Ligera hiperplasia de células basales, hiperqueratosis y paraqueratosis, pero sin atipia destacable.
- **COMENTARIOS**: La hiperqueratosis es una lesión epitelial que histológicamente se caracteriza por aumento de grosor de la capa epitelial superficial cornificada, con ausencia de núcleos. Estímulos locales, químicos, mecánicos o infecciosos (VPH) pueden ser la causa.

