

CÁNCER DE CÉRVIX DE INTERVALO ¿ES MÁS FRECUENTE DE LO QUE PENSAMOS?




-Autores: Patricia Escamilla Galindo, Janet Santana Mateo, Norberto Medina Ramos, Marta Armas Roca, Leticia María Maya Merino, Laureano León


-OBJETIVOS:

- Cáncer de cérvix de intervalo: se diagnostica en el intervalo de tiempo entre una prueba de cribado negativa y la siguiente. Infrecuente, sin factores de riesgo específicos. Más habitual en mujeres jóvenes, con VPH 18 e histología de adenocarcinoma. Se asocia con persistencia de infección VPH con cribado negativo.
- El objetivo del análisis es estudiar los casos de cáncer de cérvix invasor diagnosticados en el transcurso de un cribado oportunista con una citología normal en los últimos 3 años.

VPH



Motivo de derivación a UPTGI



-MÉTODOS:

- Estudio descriptivo retrospectivo entre **2008 y 2018** de los diagnósticos de cáncer de cérvix invasores en la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior y remitidos a Oncología Ginecológica del Hospital Materno Infantil de Canarias.

-RESULTADOS:

- De los **564** casos de cáncer de cérvix durante este periodo 57 refirieron citologías normales 1-3 años antes → cribado normal previo del **10%**.

-CONCLUSIONES:

- La **persistencia** de VPH es necesaria para desencadenar el cáncer de cérvix, en un cribado oportunista con citologías normales, puede existir un clon celular que favorezca la neoproliferación entre cribados.
- El **cáncer de cérvix de intervalo**, no es tan infrecuente, sobre todo en el contexto de un cribado oportunista.

Datos epidemiológicos

Edad media	47 años
Paridad	56% nulíparas
Anticoncepción	23% ACOs
Tabaco	33% fumadoras
Síntomas	40% sangrado vaginal 54% asintomáticas

Extirpe histológica

