



Estudio de las lesiones de alto grado en las conizaciones realizadas en 2018

Mateos Laguna M, Bayoumy Delis BS, Gambacorti Passerini ZM, Martí Edo M, Consuegra Garrido I, Moreno Pérez A.

- **Objetivos:** Es describir en las lesiones de alto grado la edad, subtipo de VPH más frecuente, cambios en la colposcopia y su concordancia, lesión hallada en la biopsia guiada por colposcopia y lesiones finales halladas en la anatomía patológica de la conización cervical.
- **Material y métodos:** Estudio retrospectivo descriptivo sobre las conizaciones cervicales con lesiones de alto grado en la citología realizadas el año 2018 y nuestros resultados.
- **Resultados:** La edad media es 39,4 de años, la edad mínima fue de 25 años y la mayor de 61 años. En el estudio se presentaron 10 casos de HSIL, 5 casos de ASC H, y 2 casos de AGC NOS. El subtipo VPH más frecuente para todos los grupos fue el 16. Al realizar la colposcopia en los casos de HSIL se observó: ausencia de lesiones en 2 casos, cambios grado 1 en 3 casos, y cambios grado 2 en 6 casos. En el ASC-H se observó: cambios grado 1 en 1 caso y cambios grado 2 en 5 casos. En el ACG-NOS se observó: cambios grado 1 en 1 caso, y cambios grado 2 en 1 caso. En la biopsia guiada por colposcopia en HSIL se observó: 3 casos con ausencia de lesión, 2 casos de CIN II, y 7 casos de CIN III. En el ASC-H los resultados de las biopsias guiadas por colposcopia fueron: 2 casos de CIN I, 3 casos de CIN II, y 1 caso CIN III. En la biopsia guiada por colposcopia en ACG-NOS se observó: 2 casos de CIN II.
- **Conclusiones:** A pesar de las escasas pacientes con lesiones de bajo grado la mayoría con lesiones HSIL presentaron cambios grado 2. La mayoría de las biopsias se correspondieron con lesiones CIN II y CIN III, así como en la anatomía patológica definitiva de la pieza de conización.

