


ADENOCARCINOMA IN SITU CERVICAL EN PACIENTE CON DESEO GENÉSICO INCOMPLETO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Miserachs Sala, Marta. Hinojosa Sánchez, Lourdes. Calveras Auge, Joana. Grané Garcia, Núria.
Fundació Althaia. Xarxa Universitària de Manresa

INTRODUCCIÓN

El adenocarcinoma in situ de cérvix (AIS) se considera una lesión premaligna precursora del adenocarcinoma cervical. En mujeres con deseo genésico incompleto se acepta realizar conización cervical y seguimiento posterior hasta tener deseo genésico cumplido. Los resultados obstétricos de las pacientes con diagnóstico de AIS y manejo conservador, no difieren de los de las pacientes conizadas por otros tipos de displasia cervical

CASO CLÍNICO



CONCLUSIONES

La conización es una opción aceptable en el manejo conservador del AIS en pacientes que deseen mantener su fertilidad. El riesgo de persistencia del AIS es < 10%. La prueba del HPV es el factor predictivo de recurrencia más importante. El hecho de que se trate de una lesión multifocal y profunda, hace que el riesgo de lesión residual post tratamiento sea alta con lo que aunque nuestra paciente haya tenido controles citológicos negativos posteriores a la conización, nos planteamos la realización de histerectomía cuando el deseo genésico sea completo.