

Situación de la vacuna del VPH en pacientes conizadas en Guadalajara 2018

Palomo, R. García, YM. Ramos, R. Santana, M. Martínez, T.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario de Guadalajara.

Objetivos

Tras una conización, ¿se vacunan nuestras pacientes?

- Cáncer cérvix, **4º** cáncer ginecológico más frecuente
- **260000** muertes anuales
- **10%** mujeres > 30 años , VPH +
- **93-100 %** tras vacunación VPH negativas

Conocer el estado vacunal de las pacientes conizadas en el año 2018 en el HUG

Material y métodos

ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO



51 casos reclutados con
Lesión preneoplásica cervical y
conización

En consultas de ginecología del HUG
Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018

Resultados

**NO VACUNADAS POST
CONIZACIÓN 42,9%**

**NO FIGURA ESTADO VACUNAL
POSTCONIZACIÓN 41,2%**

VACUNADAS PRE CONIZACIÓN 33,3%

EDAD MEDIA 35,9 AÑOS

Conclusiones

Escasa vacunación de pacientes
conizadas en nuestro medio

Historias clínicas incompletas en
casi la mitad de los casos.
(Ausencia de unidad de unidad
de patología cervical)

¿Error de transcripción de datos
o despreocupación de los
profesionales?

Necesidad de concienciación de
los profesionales sanitarios
para conseguir mayor cobertura
vacunal postconización.