



PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN VPH TRAS CONIZACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Autores: González Cerrón, S; Pérez Alonso, S; Alonso García, S; de Diego Rivera, E; Ibáñez Garicano, L

OBJETIVO

- La persistencia de la infección por VPH-AR se considera actualmente un factor asociado a recidiva junto a otros cofactores de progresión de lesión
- Existe un porcentaje de mujeres que desarrollan infección persistente por VPH-AR tras la conización y con ello mayor riesgo de recidiva y/o progresión de la lesión
- Nos planteamos revisar la persistencia de HPV-AR en nuestro área durante el año 2016



PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN VPH TRAS CONIZACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Autores: González Cerrón, S; Pérez Alonso, S; Alonso García, S; de Diego Rivera, E; Ibáñez Garicano, L

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio descriptivo de todas las conizaciones realizadas desde enero de 2016 hasta diciembre del mismo año en el Hospital Universitario de Fuenlabrada
- El diagnóstico de persistencia vírica se efectuó con el test Cobas 4800 a los 6 meses tras la conización, realizándose el test de VPH en consulta de colposcopia periódicamente hasta la negativización del mismo



PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN VPH TRAS CONIZACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Autores: González Cerrón, S; Pérez Alonso, S; Alonso García, S; Ibáñez Garicano, L; de Diego Rivera, E; Bravo Martín, C

RESULTADOS

- Se practicaron un total de 74 conizaciones en el año 2016. En un 25,7% de los casos el test de VPH-AR fue positivo (19/74). La media de la edad de las pacientes con persistencia de VPH-AR tras la conización fue de 38,21 años (24-55 años). El 36,8% de las pacientes eran fumadoras. El 24,7%, eran nulíparas. El 57,9% de las pacientes usaban preservativo como método anticonceptivo, similar a las pacientes en las que el test de VPH-AR fue negativo en el primer control. La mayor parte de las pacientes, 17 (89,5%) se habían administrado la vacuna del HPV tras la conización, en la mayor parte de los casos Cervarix. En 10 casos (57,4%) eran infecciones simples y en 9 (42,6%) eran infecciones múltiples
- Del total de pacientes positivas para virus papiloma posterior a la conización, 7 de ellas presentaron persistencia de lesión confirmadas histológicamente por biopsia cervical, 1 pacientes requirió reconización y 3 pacientes fueron intervenida de histerectomía por aparición de lesión de alto grado



PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN VPH TRAS CONIZACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Autores: González Cerrón, S; Pérez Alonso, S; Alonso García, S; de Diego Rivera, E; Ibáñez Garicano, L

CONCLUSIONES

- Las mujeres sometidas a conización cervical en nuestra unidad de patología cervical presentaron persistencia vírica en 1 de cada 4 casos
- El genotipo más frecuente fue el VPH 16
- La mayor parte de las pacientes negativizó el HPV tras 18 meses de seguimiento, aunque la persistencia de VPH-AR se relacionó en un porcentaje de las pacientes con cirugía posterior (reconización / histerectomía)