



HISTOLOGIA DE LA PIEZA DE ESCISION EN PACIENTES TRATADAS POR CIN II EN LA BIOPSIA

Madsen MA, Martínez Díez M, Prieto Moreno M, Padín López A, Hidalgo Fernández JM, Enriquez López A

Hospital Regional Universitario de Málaga

Objetivo

Conocer el resultado histológico de la pieza de conización realizada por CIN II en la biopsia dirigida por colposcopia en nuestro centro.

Material y Método


Estudio retrospectivo descriptivo, mujeres con tratamiento escisional con asa de diatermia por CIN II del 01 de enero 2018 y 31 diciembre 2018. Excluidos los CIN II-III.

Resultados


142 conizaciones en 2018

- 44 por **CIN II** (31%)
- Edad media 37 años (27-61)
- Paridad media 0,9 hijos
- Fumadoras 50%

Concordancia AP Biopsia-Cono



Determinación de HPV en el 70% de las pacientes (N=31)



Conclusiones

Si bien es conocido que lesiones CIN II, particularmente en mujeres jóvenes (<30 años) regresan espontáneamente, en nuestro estudio, la realización de un tratamiento escisional por CIN II nos ha permitido detectar un 29.5% de lesiones de mayor grado que no habían sido detectados en la biopsia; entre ellas un carcinoma infiltrante en una mujer de 27 años.