

CONIZACIONES EN MAYORES DE 50 AÑOS: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y CORRELACIÓN CITOLOGÍA-COLPOSCOPIA-BIOPSIA CÉRVIX

Dakota Viruega Cuaresma, Marta Pérez Febles, María López Pais, Carmen Elena Badillo Bercebal, María Victoria Pascual Escudero, Susana Cortés Pérez
Facultad de Medicina de Valladolid. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

OBJETIVO


Analizar las características socio-demográficas y resultado de pruebas complementarias en pacientes mayores de 50 años sometidas conización.

MATERIAL Y MÉTODOS


TIPO DE ESTUDIO	Observacional, descriptivo y retrospectivo.
MUESTRA	22 conizaciones en mujeres > 50 años
PERIODO	Enero 2016 – Mayo 2019
VARIABLES	- Características demográficas - Resultado citológico y VPH - Hallazgos colposcópicos y biopsia.
FUENTE	Base de datos de la Unidad, Servicio de Anatomía Patológica e historias clínicas

RESULTADOS


Edad media	56.9 (50-68)
Tabaquismo	41%
Barrera	13.6%
Vacunación pre-conización	4.5%



	Negativo	L-SIL	H-SIL
C. GRADO I	1 (10%)	8 (70%)	2 (20%)
C. GRADO II	0 (0%)	4 (33%)	8 (67%)



	Negativa	LSIL/CIN I	HSIL/CIN II-III
Citología normal	1 (16%)	2 (33%)	3 (51%)
Citología LSIL	0%	7 (70%)	3 (30%)
Citología HSIL	0%	3 (50%)	3 (50%)



CONCLUSIONES

- La edad, el tabaco y el no uso de barrera son los factores de riesgo más importantes para la persistencia del VPH. De nuestras pacientes, el 97% no utilizan barrera, 41% son fumadoras y solo una mujer está vacunada. Debemos continuar insistiendo en la corrección de estos factores en mujeres añosas.
- Nuestra capacidad diagnóstica para lesiones de bajo y alto grado en este grupo de mujeres, se encuentra en un rango aceptable con una correlación del 70% y 67%.
- En nuestra población, el 27% tenía citología normal, de las cuales más del 85% presentaron lesiones cervicales. La evidencia disponible pone de manifiesto que la prueba de VPH-AR es más eficaz que la citología como forma de cribado en mujeres mayores de 30 años.