



Lesión de Paget de 1 cm adyacente a labio menor izquierdo en paciente con dos cirugías previas (hemivulvectomy posterior con colgajo cutáneo + resección posterior de lesión de Paget recidivada en labio menor izquierdo y surco interlabial).

Imagen previa a inicio de tratamiento con Imiquimod tópico .



Desaparición de lesión previa tras tratamiento tópico con Imiquimod a dosis inicial de 3 aplicaciones semanales. Mantenimiento con una aplicación semanal.

Actualmente en remisión completa .

Análisis descriptivo de una muestra de pacientes con diagnóstico de Paget vulvar

De Diego Yenes M., Rando Zalduendo D., Molina Contreras O., Gutiérrez Cordonedá J., Díez García J., Otero B.

— Objetivos:

Analizar las indicaciones y resultados del tratamiento con Imiquimod en pacientes diagnosticadas de Paget vulvar en el H.U Cruces, como alternativa al tratamiento quirúrgico habitual, ante su alta tasa de recidiva.

— Material y métodos:

Análisis descriptivo y revisión de 3 casos de pacientes tratadas con Imiquimod, tanto en recidivas como en tratamiento primario, en enfermedad de Paget vulvar.

— Resultados:

De las dos pacientes en las que se indicó Imiquimod como tratamiento de las recidivas tras cirugía, se observó remisión completa en una de ellas y remisión parcial en la otra, tras 7 meses de tratamiento.

La paciente en la que se indicó Imiquimod como tratamiento primario, se encuentra actualmente en remisión parcial, tras seis meses de tratamiento tópico con tres aplicaciones semanales.

Las dos mujeres que se encuentran en remisión parcial están asintomáticas, sin prurito vulvar, desde el inicio de tratamiento con Imiquimod tópico.

— Conclusiones:

La Enfermedad de Paget vulvar se caracteriza por su alta tasa de recidivas, lo que conlleva en muchos casos la necesidad de múltiples cirugías. Por tanto, parece lógico buscar alternativas terapéuticas a la cirugía, siendo el Imiquimod una posibilidad prometedora.