


³Servicio Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

En los últimos años ha habido informes contradictorios sobre el riesgo de cáncer en la esquizofrenia. Sin embargo, al analizar los datos específicos del cáncer de cuello uterino, los resultados muestran un mayor riesgo entre las pacientes con esquizofrenia, en comparación con población general. Lin y sus colegas informaron un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino entre las mujeres con esquizofrenia a edades tempranas (<50 años) y Ji encontró un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, entre otros cánceres específicos de género, después del primer diagnóstico de esquizofrenia. Por otra parte, los factores de riesgo descritos para desarrollar cáncer de cérvix se solapan en muchas ocasiones con conductas de riesgo en pacientes con psicosis.

Objetivos:

- 1) ¿Hay más patología cervical en una población psiquiátrica?
- 2) ¿Se adhieren peor las mujeres con psicosis a los programas de cribado?



Resultados	Casos (N= 295)	Controles(N=77)	Test estadístico
Edad(años)	44,4	40,6	F=8,790; p=0,003*
Realización cribado(%)	67,1%	81,6%	X ² =5,986; p=0.009*
Numero de citologías totales	3,3	3,7	F=0,961; p=0,328
Tiempo entre citologías(Años)	4,7	3,3	F=4,808; p= 0,029*
Alteraciones citológicas	14	6	P>0,05
Resultados histológicos CIN2+	10	1	Yates' chi-square= 0.537; Yates' p= 0.463

Conclusiones

1. Las mujeres con patología psiquiátrica tipo psicosis se adhieren peor a los protocolos de cribado de cáncer de cérvix.
2. Este estudio muestra como un porcentaje de mujeres con psicosis no se ha sometido en ninguna ocasión a las pruebas de cribado disponibles (citología), pero además entre las que sí se han sometido a citología, hay un mayor riesgo de que no sigan correctamente el protocolo (cada 3 años).
3. Este peor cribado, comparado con el grupo control, seguramente determine un mayor riesgo de evolución de patología cervical hacia estadios de mayor gravedad sin detección temprana.
4. Esto se relación con una incidencia significativamente más elevada de patología cervical en comparación con población general, llegando a un riesgo 10 veces mayor.

Material y métodos:

Programa Cantabria de Intervención Temprana en Psicosis (PAFIP)

