



Seguimiento de las pacientes conizadas con márgenes afectos durante 3 años.

Gómez Molina, MG; Coronel Villarán, MJ; Rojas Luna, JA; Daza Manzano, C; Fernández-V V, L. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

OBJETIVOS


Analizar la presencia de los factores de progresión en las pacientes conizadas y evaluar su influencia en la persistencia de lesión e infección por HPV en 3 años de seguimiento

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo en el que se analiza la presencia de los factores de progresión en pacientes conizadas con márgenes positivos, en diferentes escenarios clínicos según el resultado de la citología y el Virus del Papiloma Humano durante 3 años de seguimiento

RESULTADOS

Del total de pacientes conizadas durante un año, el 34,4% tuvieron márgenes afectos. Dicha muestra se estratificó en 4 grupos según el resultado del co-test en la primera revisión tras la conización: 1. Citología-HPV negativo. 2. Citología positiva-HPV negativo. 3. HPV positivo-citología negativa, 4. Citología-HPV positivos. Se analizó la presencia de los siguientes cofactores de progresión: consumo de tabaco, uso de preservativo, vacunación y paridad.



CONCLUSIONES

Los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que la gran mayoría de mujeres infectadas por tipos de VPH-AR nunca presentará cáncer cervical. Solo una pequeña fracción progresará a CIN2-3 y eventualmente a cáncer. Estos datos sugieren que existen otros cofactores que modulan el riesgo de progresión de la infección VPH a cáncer. Los resultados de nuestro estudio apoyan la evidencia científica actual.