



PERSISTENCIA DE VPH-AR POSITIVO EN LAS PACIENTES CONIZADAS EN EL ASSIR DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Mitjans Carrasco, J ⁽¹⁾ ; Abad Gil, I ⁽¹⁾ ; Luis Labrador, J ⁽¹⁾ ; Vinagre Brugada, MP ⁽¹⁾ ; Blasco Zapater, MP ⁽¹⁾ . 1 ASSIR Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

La unidad de patología cervical del ASSIR (Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva) de Santa Coloma de Gramenet entró en funcionamiento en diciembre de 2014. Desde entonces se han llevado a cabo 121 conizaciones ambulatorias. El control post-conización que realizamos es la determinación de co-test a los 4 o 6 meses en función de los márgenes quirúrgicos de la pieza.

Nuestro objetivo es la cuantificación de los VPH-AR (Virus del Papiloma Humano de alto riesgo) positivos post-conización, la observación de su evolución y la descripción de las características clínicas de dichas pacientes que puedan tener impacto en la evolución de su enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, observacional, longitudinal y retrospectivo. Se revisan 121 pacientes conizadas en el ASSIR de Santa Coloma entre diciembre de 2014 y agosto de 2019.



Variable principal: determinación positiva del VPH-AR post-conización.

Variables secundarias: edad, tabaco, vacunación, lesión asociada, márgenes de la pieza quirúrgica, evolución y actuación posterior.

CONCLUSIONES

1. La persistencia de VPH-AR tras un tratamiento escisional disminuye con el tiempo. La tasa en nuestro centro es similar a la descrita en la evidencia publicada.
2. La persistencia de VPH-AR es un buen indicador de fracaso del tratamiento.
3. La ausencia de VPH-AR post-conización supone un riesgo muy bajo de persistencia o recurrencia de lesión cervical (valor predictivo negativo muy alto).
4. Los factores de riesgo asociados a persistencia de VPH-AR después de una conización (edad >50 años, tabaco, no vacunación, márgenes de la pieza positivos) no son valorables en nuestra serie por tamaño de la muestra insuficiente.

RESULTADOS



Al año de la conización, 10 de las 105 pacientes que siguen controlándose en nuestro centro tienen una prueba VPH-AR positiva (6 con VPH persistente y 4 con VPH negativo en primer control y positivo en el segundo).

Tasa de positividad del VPH-AR al año de la conización: 9,5%.

En las 4 pacientes que han requerido una segunda intervención se objetivó una persistencia de lesión de alto grado en el primer control post-conización:

- 3 de ellas tenían una pieza de conización con al menos un margen afecto.
- Su edad está comprendida entre los 35 y 45 años.
- Todas habían sido vacunadas.
- Todas fumadoras.