

REVISIÓN DE LESIONES VULVARES INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO EN EL HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. 2013-2019

Blanco Herráez I, Gutiérrez Martínez M, Pineda Dominguez L, Sanz Baro R, Ferreira Borrego I, Álvarez Gil C


OBJETIVOS:

- Evaluación de las lesiones intraepiteliales vulvares de alto grado (HSIL vulvar) determinando factores de riesgo predisponentes
- Evaluación del tratamiento realizado, en términos de eficacia
- Valoración del porcentaje de recidiva posterior.


MATERIAL Y MÉTODOS:

- Base de datos que incluía pacientes con diagnóstico de HSIL vulvar.
- Parámetros analizados: edad, factores de riesgo predisponentes al desarrollo: tabaco, antecedente de displasia cervical intraepitelial en cérvix o inmunosupresión (diabetes, VIH, etc).
- Se evaluó el tipo de tratamiento realizado a cada paciente.


RESULTADOS



Diagnóstico Histológico



Tratamiento



Tasa de recidiva

Vaporización	3/14 (21,4%)
Resección local	0/9 (0%)
Resección + vaporización	2/5 (40%)
Vulvectomy	1/3 (33,3%)
Hemivulvectomy	1/2 (50%)
Imiquimod	0/2 (0%)

CONCLUSIONES

A tasas de recidiva similares, se prefieren tratamientos conservadores.