



Concordancia Cito-Colposcópica-Histológica de las lesiones cervicales en nuestro medio


Álvarez Cabrera, Esther; Merino Márquez, Ana; López Mármol, Rocio; Santaella Navas, Maria; Lázaro Lorente, Marisol; López Ortiz, Luz.
Hospital Costa del Sol Marbella Málaga

Se analizó las conizaciones realizadas entre **Julio y Diciembre de 2018** en el Hospital Costa del Sol de Marbella.


89 CONIZACIONES

Analizando la concordancia del resultado de la citología y de la colposcopia con el de la conización.

¿Concordancia?




Citología



Colposcopia



Resultado
conización



Cuando hemos tenido una citología que mostraba HSIL/ASCH/c in situ la colposcopia mostraba Grado 2 en un 77.3 % de los casos.

concordancia cito-colposcópica

62,1 %

El 77% de las citologías de alto riesgo tienen lesiones histológicas en la conización de alto riesgo : CIN III/in situ

Citología

VPP 77 %

VPN 45%

Correlación entre colposcopia grado 1 y resultado de la conización de CIN III/in situ en un 84.7 % de los casos.

Colposcopia

VPP 76,5%

VPN 44,4%

Tanto la citología como la colposcopia tienen el mismo rendimiento Diagnóstico en nuestro medio.