

PACIENTES CON CITOLOGÍA NEGATIVA Y VPH POSITIVO QUE PRECISARON UNA CONIZACIÓN

Hernando Prada, N; Argüelles Álvarez, S; Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa, M; Pérez Gutiérrez, A; Petersen Pérez, L. Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Madrid.


OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es analizar los resultados histológicos obtenidos de la conización en mujeres con lesiones cervicales y relacionar estos resultados con la citología de la que procedían en el cribado inicial. Este análisis permite conocer las frecuencias relativas de cada tipo de lesión en la población de conizaciones, así como corroborar la impresión subjetiva que el equipo de PTGI tenía acerca de que existía un porcentaje no despreciable de citologías normales en mujeres que finalmente precisaron una conización.


MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional descriptivo de corte transversal de 109 conizaciones cervicales realizadas entre enero 2017 y enero 2019 en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, en mujeres de 26 a 66 años. Partiendo del total de conizaciones, se recogieron los resultados de las citologías realizadas mediante cribado oportunista (negativa, ASC-US, LSIL, HSIL, ASC-H, ACG y carcinoma epidermoide), los resultados de las biopsias que condujeron a la conización (LSIL persistente, HSIL, ASC-H, carcinoma epidermoide) y el genotipo VPH (alto riesgo 16 y/o 18, alto riesgo distinto a 16 y 18, negativo y desconocido). Tras estratificar el total de pacientes según el informe histológico definitivo de las piezas quirúrgicas (ausencia de lesión, LSIL, HSIL y carcinoma epidermoide) se comprobaron las proporciones de citologías normales en el cribado para cada grupo.

Total de citologías negativas con VPH positivo
(27 pacientes)



Total de conizaciones
(109 pacientes)



RESULTADOS

De los 109 tratamientos escisionales, 27 procedían de una citología negativa y fueron derivadas a colposcopia por presentar un VPH positivo. Los resultados de las biopsias colposcópicas por los que se indicó una conización en estas 27 pacientes fueron: 4 LSIL, 22 HSIL y 1 carcinoma epidermoide. Los diagnósticos anatomopatológicos de las piezas de conización de estas pacientes fueron: 4 conizaciones en blanco, 5 LSIL, 16 HSIL y 2 carcinomas epidermoides. A los 6 meses de la conización, 21 pacientes negativizaron el VPH y 6 presentaron una persistencia del VPH. Ninguna de las 27 pacientes precisó una reconización.

CONCLUSIONES

En nuestro centro realizamos un cribado oportunista: a las pacientes con co-test negativo se les repite cada 5 años, y a aquéllas con citología negativa y VPH positivo se les ofrece colposcopia inmediata. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que, en el supuesto de no haber realizado colposcopia a las 27 pacientes con citología negativa y VPH positivo, no se habrían detectado 16 HSIL ni 2 carcinomas epidermoides, lo que supone un 66'67% de estas pacientes.