

FACTORES DE MAYOR PESO EN LA RECIDIVA DE LA DISPLASIA POST CONIZACIÓN

García Fernández, JA; Tuya De Manuel, P; Rodríguez-Vijande Alonso, B; Azcona Calzado, S; García Martín, R; Garcia Gomez, A.

Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón, Asturias)

OBJETIVOS

El objetivo principal fue identificar los factores más relevantes en la reaparición de lesiones de displasia de cérvix tras una conización, requiriendo en muchos de los casos una reconización.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio analítico observacional de carácter retrospectivo (cohorte histórica) en el Hospital Universitario de Cabueñes.

Se estudiaron 342 pacientes conizadas.


Se incluyeron las siguientes variables: Edad, recidiva, márgenes quirúrgicos, lesión histológica en el cono, VPH previo y posterior, tabaquismo, Lesión inicial, anticonceptivos orales y presencia o no de pareja estable

Para evaluar el efecto de los diferentes factores sobre el riesgo de recidiva se realizó un análisis de supervivencia y un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox que estima los Hazard Ratio (HR)

RESULTADOS

Los resultados del análisis demuestran que la persistencia de VPH es el factor principal asociado a la recidiva de la displasia posterior a una conización, el cálculo del Odds Ratio revela un valor muy alto, lo cual significa que aquellas mujeres cuyo VPH posterior fue positivo tenían muy aumentado el riesgo de recaída respecto de las que no, a iguales condiciones que el resto.

El resto de variables no mostraron correlación en nuestro estudio, entrando en conflicto con la literatura existente



CONCLUSIONES

- **Nuestro estudio reveló que el factor de mayor peso en la recidiva de la displasia de cérvix postconización fue la persistencia o reinfección por VPH**
- **Los anticonceptivos orales son un factor de confusión para las variables.**
- **Ninguna de las demás variables presentó relación con el evento estudiado.**