



CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS PACIENTES CON NEOPLASIA VULVAR INTRAPITELIAL (VIN) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES

Iñigo Melchor, Julieta Gutiérrez, Amaia Aiartzagüena, Ane Iza, Borja Otero, Javier Díez
Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario Cruces (Bizkaia)

OBJETIVOS

La neoplasia vulvar intrapitelial (VIN) se considera la lesión precursora del cáncer de vulva. Dicha entidad es claramente infradiagnosticada, por lo desapercibidas que pueden pasar sus lesiones. En los últimos años, se ha observado una mayor incidencia de VIN, especialmente en pacientes jóvenes. Además, existen características epidemiológicas diferenciales entre las pacientes con VIN tipo común y tipo diferenciado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo y retrospectivo de la base de datos de pacientes de la Consulta de Patología Cervical y Vulvar. Dicha base de datos incluye todas las pacientes diagnosticadas de VIN (n=46).

CONCLUSIONES

Las características poblacionales observadas en las pacientes con VIN tipo común y tipo diferenciado se asemejan a las descritas por la literatura. Hemos observado asociación entre el VPH y VIN tipo común, y una mayor edad en las pacientes con VIN tipo diferenciado

RESULTADOS

	VIN tipo común (n=32)	VIN tipo diferenciado (n=14)
Edad	48	67
Motivo de consulta	Prurito 25% Lesión 56% Prurito + lesión 19%	Prurito: 42% Lesión: 42% Prurito + lesión: 16%
Inmunodepresión	30% (10/32)	30% (5/14)
VIH	12,5% (4/32)	0%
Tabaco	62,5% (20/32)	3% (1/32)
A.P.		
Asociación con HPV	47% (15/32)	0%