

EDAD Y SEROTIPOS HPV DE ALTO RIESGO EN CONIZACIONES POR DISPLASIA CERVICAL

Natalia Del Valle Sánchez Baudo F.E.A.; Silvia Morales Muñoz F.E.A.; Esmeralda López López M.I.R
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Poniente. El Ejido, Almería.

OBJETIVOS:

Estudiar la prevalencia de los distintos serotipos de HPV segun edad en pacientes con displasia cervical sometidas a conización

METODOLOGÍA

Se realizo un estudio retrospectivo descriptivo desde el 01/01/17 al 31/12/18 en el Hospital de Poniente (Almeria) que incluyo pacientes conizadas por displasia cervical. A todas las pacientes se les determinó el serotipo viral previo al procedimiento, discriminandose la muestra en 3 grupos: "grupo HPV 16", "grupo HPV 18", "otros serotipos HPV-AR". La edad fue clasificada para analisis en intervalos de 10 años y se dividió para conclusiones en dos grandes grupos: "edad reproductiva" y "postmenopausia"

RESULTADOS

Se incluyeron 144 pacientes a las que se les realizo conizacion por displasia cervical. La edad promedio de conizaciones fue de 38 años (rango entre 23-77). 130 conizaciones fueron realizadas en edad reproductiva de las cuales 60,8% (79/130); fueron por HPV 16, 0,7% (1 /130) por HPV 18, 38,5% (50/130) por otro HPV AR. 14 conizaciones se realizaron en postmenopausicas de las que 42,9% (6/14) fueron por HPV 16, 7,1% (1/14) por HPV 18 y 50% (7/14) por otros serotipos HPV AR.

CONCLUSIONES

En las pacientes conizadas que se encontraban en edad reproductiva el serotipo prevalente es claramente el 16, mientras que en la postmenopausia lo son otros serotipos de Alto Riesgo (no 16 ni 18). En nuestro medio el serotipo 18 no ha mostrado una prevalencia global importante. Estos hallazgos nos llevan a cuestionar el programa propuesto de cribado (principalmente en pacientes postmenopausicas) en el que solo se realizaria colposcopia a las pacientes con serotipo 16 y 18 (opcional 45), con la posibilidad de infradiagnosticar lesiones susceptibles de tratamiento precoz.

