

Uso del 5-Fluorouracilo en pacientes con HSIL-VaIN en el Hospital Regional de Málaga

Amaya Urgal, Beatriz Triplana, Estela Valdivia, M^a Concepción Reyes

Existen numerosas opciones terapéuticas para la Neoplasia Vaginal Intraepitelial de alto grado (HSIL-VaIN), incluyendo tratamientos tópicos, escisionales, ablativos y radioterapia. La baja incidencia del proceso y la falta de estudios amplios y bien diseñados hace difícil llegar a un consenso sobre cuál de ellos es la mejor opción, como queda reflejado en la Guía de la AEPPCC. Publicaciones recientes han reportado altas tasas de remisión tras el empleo de 5-FU.

El **OBJETIVO** de este trabajo es analizar los datos reportados tras el uso del 5-FU en pacientes con HSIL-VaIN en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 13 pacientes tratadas en nuestro centro por HSIL-VaIN desde enero de 2013 hasta julio de 2019. Tiempo medio de seguimiento de 9 meses (mediana de 10 meses), con un rango entre 1 y 20 meses.



A falta de conocer el resultado de 2 de las pacientes de este subgrupo, el **porcentaje de remisión atribuible al 5-FU fue del 57% (4/7)**.

Como **CONCLUSIÓN**, el uso del 5-FU en HSIL-VaIN supone una terapia prometedora, si bien son necesarios futuros análisis con un tamaño muestral mayor y un seguimiento a más largo plazo.