

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA UNIDAD DE PATOLOGÍA CERVICAL Y COLPOSCOPIA

ESTUDIO DESCRIPTIVO

Zamora Lapiedra M, Donoso Dorado L, Martí Malgosa L, Cochs Cosme B, Guil Miret M, Canet Estévez Y.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Parc Taulí Hospital Universitari.
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell, Spain



INTRODUCCIÓN

La colposcopia es un procedimiento diagnóstico que ha demostrado su importancia en la prevención secundaria del cáncer de cérvix puesto que permite reducir su incidencia y mortalidad. La calidad de la técnica es crucial en este sentido y por ello se han desarrollado unos estándares de calidad.

El **objetivo** es revisar si nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia cumple con los **indicadores de calidad colposcópica** propuestos por la *Guía: Colposcopia, estándares de calidad. AEPPCC 2018* basados en los criterios de la *European Federation for Colposcopy (EFC)* en París, 2017.

MÉTODOS

Estudio descriptivo

Análisis de las colposcopias, biopsias y tratamientos escisionales realizados en las pacientes controladas en nuestra Unidad de Patología Cervical y Colposcopia durante el 2018.

Variables

Indicadores de calidad EFC 2017 (Guía AEPPCC 2018)

RESULTADOS

INDICADOR DE CALIDAD	PORCENTAJE DESEADO	PORCENTAJE OBTENIDO
Descripción y registro de las características de la lesión <i>Tipo lesión, localización, visibilidad, semiología</i>	>90%	100%
Impresión colposcópica	>90%	100%
Correlación colposcopia/biopsia <i>Nivel de aciertos entre la impresión diagnóstica de la colposcopia y el resultado de la biopsia</i>	> 70%	60.9%
Biopsias con material representativo adecuadas para la valoración	>90%	98.1%
Número de conizaciones anuales		64
Número de conizaciones realizadas de forma ambulatoria	> 70%	28.1%
Porcentaje de conizaciones realizadas bajo control colposcópico	> 90%	28.1%
Cumplimiento de los tiempos de espera desde el diagnóstico al tratamiento (<10 semanas)		37.5%
Número de conizaciones con diagnóstico histológico lesión ≥ HSIL/CIN2	> 70%	82.8%
Número de conizaciones sin lesión histológica	<15%	7.8%
Porcentaje de conizaciones con márgenes afectos	<20%	28.1%
Porcentaje de conizaciones con margen endocervical afecto	<15%	20.3%
Porcentaje de complicaciones hemorrágicas con ingreso	<5%	4.7%
Porcentaje de casos tratados de HSIL/CIN con citología ≥ HSIL/CIN2 a 6 meses de tratamiento	<10%	1.6%
Cumplimiento de administración de la vacuna frente al VPH post-conización	>90%	85.9%

CONCLUSIONES

La Unidad de Patología Cervical y Colposcopia de nuestro centro **cumple con la mayoría de** los indicadores de calidad analizados. Hemos detectado **puntos de mejora** como son el número de conizaciones realizadas de forma ambulatoria así como la realización de colposcopia previa a las mismas. Hemos iniciado medidas para mejorar dichos indicadores. Es necesario **evaluar los indicadores de calidad** para asegurar una mejora del control colposcópico de estas lesiones y su tratamiento.