

HALLAZGO INCIDENTAL DE QUISTE VAGINAL

ANA ISABEL GUZMÁN LEÓN, LORENA SABONET MORENTE, MANUEL NAVARRO ROMERO, ANTONIA ENRIQUEZ LÓPEZ

Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN:

Los quistes vaginales corresponden a formaciones saculares cubiertas por mucosa vaginal. La mayoría son asintomáticos, únicos, benignos y no requieren escisión, aunque es importante realizar un diagnóstico diferencial, ya que pueden tener otro origen y presentarse de forma similar.

CASO CLÍNICO:

Presentamos un caso clínico de hallazgo incidental de un quiste vaginal durante una revisión rutinaria. Se trata de una mujer de 34 años, nuligesta y sin antecedentes de interés que acude voluntariamente a una revisión ginecológica rutinaria. Las revisiones previas eran normales, así como los controles citológicos. Durante la exploración vaginal se halla un nódulo liso, indoloro, de aspecto quístico, ligeramente fluctuante de 3 x 4 cm y localizado en el fondo de saco vaginal anterior (fig.1), siendo el resto de la exploración tanto de genitales externos como internos totalmente anodina. Se realiza además ecografía transvaginal confirmando genitales internos normales y donde se visualiza el hallazgo vaginal descrito como una formación unilocular anecoica de 4 x 3 cm aproximadamente.

DISCUSIÓN:

La presencia de un quiste en la vagina está estimada en un 1%. Existen distintas clasificaciones, en general se considera en estas su histología, localización y origen. Según este último, no todas las lesiones que observamos proceden de la vagina, esto es importante porque existen lesiones que surgen en la uretra, parauretrales y de otros tejidos circundantes que se presentan de manera similar. Por esta razón no es fácil realizar un diagnóstico etiológico de certeza, aunque siempre es conveniente realizarlo para valorar el tratamiento. En nuestro caso ese fue realizado mediante la exploración y la realización de una ecografía transvaginal.



Figura 1