

¿Hay diferencias en hábitos sexuales entre pacientes vacunadas y no vacunadas de HPV?

Damián Ángel Sánchez Torres; Jesús de la Fuente Valero; Gema Aguión Gálvez; Ester Martínez Lamela; Daniela Martínez Carrillo; Juan José Hernández Aguado.



Objetivos

Se pretende describir las diferencias en el comportamiento sexual entre dos cohortes de pacientes de 25 años, vacunadas y no vacunadas de HPV, estudiadas en el contexto en el contexto de un estudio de efectividad vacunal frente al VPH en desarrollo actualmente en el Hospital Universitario Infanta Leonor.

Material y métodos

Estudio descriptivo de corte transversal en el contexto de un estudio postautorización de seguimiento prospectivo.

Entrevista personal realizada por una matrona del equipo investigador.

473 participantes: 265 vacunadas y 205 no vacunadas. 4 desconocían status vacunal. Edad media de las participantes igual en ambos grupos: 25,1 años.

Vacunada HPV




Resultados


En el grupo vacunado el número medio de parejas sexuales fue **4,94** (4,32-5,56 IC 95%) vs **5,72** (4,86-6,58 IC95%) en el grupo no vacunado.

La edad media de inicio de RRSS en el grupo vacunado fue: **17,23** (16,97-17,49 IC95%) vs **16,89** (16,55-17,23 IC95%) en el grupo no vacunado. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas.

Número medio de parejas sexuales




Edad media de inicio de relaciones sexuales



En el grupo vacunado 106 participantes (40%) se declaraban usuarias de preservativo y 10 doble método (4%). 88 eran usuarias de anticonceptivos orales combinados o de solo gestágeno (33%), 13 eran usuarias de anillo anticonceptivo (5%). Por el contrario, 33 (12%) declararon no usar ningún método anticonceptivo.

En el grupo no vacunado 66 participantes (32%) se declaraban usuarias de preservativo y 3 doble método (1%). 79 eran usuarias de anticonceptivos orales combinados o de solo gestágeno (39%), 10 eran usuarias de anillo anticonceptivo (5%). 31 (15%) declararon no usar ningún método anticonceptivo.

La utilización de otros métodos anticonceptivos fue muy infrecuente en ambos grupos. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.




En el grupo vacunado 89 participantes referían uso de preservativo siempre (34%) y 40 en la mayoría de las relaciones sexuales (15%). 61 pacientes indicaron que nunca usaban preservativo (23%).

En el grupo no vacunado 49 participantes utilizaban preservativo siempre (24%) y en la mayoría de las ocasiones 18 (9%). 54 participantes indicaron que no empleaban preservativo nunca (26%). Las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

En el grupo vacunado se refirieron 3 casos de chlamydias, 1 de gonococo y 4 de herpes genitales, frente a 5 casos de chlamydias, 1 gonococo y 5 herpes en el grupo no vacunado, no siendo estas diferencias significativas.

Uso del preservativo



Conclusiones

En el presente trabajo no se detectan diferencias significativas en el comportamiento sexual de las pacientes vacunadas respecto a las no vacunadas.

En nuestra población se ha observado que en las pacientes vacunadas la edad de inicio de relaciones sexuales es algo mayor y el número de parejas sexuales menor. Asimismo, el uso de preservativo y de doble método fue mayor en el grupo vacunado, mientras que las pacientes no vacunadas mostraban preferencia por anticonceptivos orales. Todas estas pequeñas diferencias no tuvieron significación estadística.