



HOSPITAL UNIVERSITARIO
RÍO HORTEGA

Análisis retrospectivo de las conizaciones indicadas por lesión intraepitelial de bajo grado persistente

Lera Ramírez A, Gil Guillén L, Viteri Estévez JM, García Yuste M, Méndez Guevara DC, Solé Mayoral A
Hospital Universitario Río Hortega Valladolid

OBJETIVOS

Analizar los resultados histológicos obtenidos en pacientes sometidas a conización cervical por lesión intraepitelial de bajo grado persistente por encima de dos años.

MATERIAL Y MÉTODOS


Estudio retrospectivo de las 111 conizaciones llevadas a cabo en nuestro centro entre Enero de 2018 y Agosto de 2019.

CONCLUSIONES

Aunque el riesgo de progresión de LSIL es muy bajo, existe un riesgo de progresión que mantiene la indicación de conización por encima de 2 años de presencia de la lesión.


RESULTADOS

Indicación de conización



El LSIL persistente supuso el 27% de las indicaciones de conización. La edad media de estas pacientes fue de 43 años (SD: 7,20).

AP en pieza de conización



SEROTIPO HPV EN PACIENTES CON LSIL PERSISTENTE

16-18	37%
Alto Riesgo no 16-18	40%
Negativo	17%
Bajo riesgo	7%