

Importancia de la información adecuada acerca de la vacunación frente al vph. ¿Qué influencia tenemos sobre la paciente?

Maddalen Martinez Dolara; Elena Prieto Ruiz; Ainhoa Campo Careaga; Ana Vazquez Del Campo; Alazne de Castro Momoitio; Diego Erasun Mora. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

El **virus del papiloma humano** representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes implicado en el desarrollo de cáncer de cérvix y de sus lesiones precursoras. La **vacunación sistemática**, se considera hoy en día la intervención más eficaz y efectiva para el control de la infección.

El objetivo es estudiar la **influencia que tiene el ginecólogo** sobre la paciente en la consulta de colposcopia de cara a la vacunación frente al VPH. ¿Dedicamos tiempo en la consulta a informar sobre la vacuna? ¿Damos una información adecuada? ¿Qué porcentaje de pacientes se vacunan tras recibir información?

MATERIAL Y MÉTODO:

Se ha analizado una recogida de datos retrospectiva longitudinal que incluía a pacientes a las que se les realizó una técnica escisional Lletz entre los años 2016 y 2019. En total se recogieron datos de 478 mujeres con una media de edad de 41 años (+/- 11 años). Se han revisado las historias clínicas de las pacientes fijándonos en las notas recogidas por el ginecólogo, determinando si se recogen datos acerca de la información transmitida sobre la vacunación frente al VPH. En función de los hallazgos, las pacientes han sido clasificadas en **vacunación propuesta, vacunación administrada e información desconocida**.

RESULTADOS:

Tras el análisis de las anotaciones, se observa que en la mayoría de los casos **no se dispone de datos** acerca de la información de la vacunación (**89,26%**). Esto posiblemente se deba a una **falta de tiempo** en la consulta, tanto para informar a la paciente como para anotarlo. En un **6,31%** la paciente es **informada** y se le propone la vacuna. El **4,42%** ha sido **vacunada** o está en proceso de administración. Las pacientes que han recibido información por escrito tienen tasa de vacunación más alta. Entre las vacunadas, se observa un porcentaje más elevado de **pacientes jóvenes**, 54% (menores de 35 años), y el resto, 46%, son pacientes con edades comprendidas entre 35 y 45 años.

CONCLUSIONES:

Es muy importante establecer una comunicación adecuada con la paciente y en un ambiente de confianza, para que la información transmitida sea entendida y asimilada. La paciente debe entender la indicación de la vacuna, las pautas de administración, así como los posibles efectos secundarios. Dedicar unos segundos en la consulta a este tipo de información es de vital importancia, entregando notas informativas prediseñadas para afianzar lo explicado. Nuestros datos muestran un bajo porcentaje de respuesta a nuestras recomendaciones, por lo que deberíamos enfatizar y hacer un mayor hincapié en la información que damos en la consulta.

Vacunación frente al
vph en la consulta:

