

TRATAMIENTO ESCISIONAL POR LESIONES CERVICALES DE ALTO GRADO (H-SIL) EN MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS, NUESTROS RESULTADOS.

Enríquez López A, Madsen MA, Martínez Díez A, Padín López A, Prieto Moreno M, Hidalgo Fernández JM
Hospital Regional Universitario de Málaga

Objetivos:


1. Describir los resultados de las conizaciones en mujeres de 50 años o más tratadas con escisión con asa de diatermia por HSIL en la biopsia.
2. Evaluar los resultados de primer control postconización.

Material y métodos:

- Estudio retrospectivo descriptivo entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2018.
- Mujeres ≥ 50 años
- Conización con asa por HSIL en biopsia
- Se estudiaron los resultados de la conización y del primer control.

Resultados:

AP cono



Márgenes afectados: 47,6%

- 80% el margen endocervical
- 40% correspondían a micro/invasión

142 conizaciones (2018)
97 quiróf. / 45 consulta

≥ 50 años $\rightarrow$ 23
pacientes

Edad media = 58,8 (50-73)

Fumadoras = 60,8%

Control 4-6 meses

PAP	%
Negativa	76,5
LSIL	11,7
ASC-H	11,7

Test HPV	%
Negativa	33,3
Positivo	44 (62,5% AR)
Desconocido	22,2

Tanto el grupo de margen positivo como negativo, tuvieron un **50% HPV positivo** en la 1ª visita de control

Conclusiones: Es sabido que las mujeres mayores de 50 años y márgenes afectados tienen un alto riesgo de persistencia del HPV. En nuestro estudio, encontramos un 21.7% de ca. invasivos/microinvasivos en el cono, y en el primer control postconización un test de HPV positivo en el 44% (62% de AR), lo que identifica a este grupo etario como de alto riesgo de recurrencia obligando a un estricto seguimiento.