

¿El HPV post-conización es marcador de persistencia de lesión/infección por HPV?

Gómez Molina,MG; Coronel Villarán,MJ; Rojas Luna,JA; Larre Meneses,F. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

OBJETIVOS

Analizar si el resultado del HPV post-cono se asocia a persistencia o recurrencia de lesión/ infección por HPV



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo en el que realizamos el seguimiento de las pacientes conizadas con márgenes afectos durante 3 años según el resultado de HPV intracono. Se evalúan resultados de co-test, biopsias guiadas por colposcopia, LEC y si precisó tratamiento posterior (reconización/histerectomía)


RESULTADOS

Se analizaron las pacientes conizadas en 2016 con márgenes afectos en un periodo de 3 años.Se estratificaron a las pacientes según el resultado del HPV post-cono.

1.HPV intracono positivo (76,4%)



2.HPV intracono negativo (11,7%)



CONCLUSIONES

Según la evidencia una prueba de VPH-AR positiva a los 6-12 meses postratamiento, permite identificar con una elevada sensibilidad las pacientes con fallo del tratamiento.Una prueba VPH negativa supone un riesgo extremadamente bajo de persistencia o recurrencia.Según nuestro estudio podemos concluir que las pacientes con HPV positivo post-cono tienen más riesgo de tener lesión e infección persistente y una mayor probabilidad de reconización.