


Influencia del tipo de asa de diatermia en los resultados de las conizaciones cervicales

Sanz Baro R, Gutiérrez Martínez M, Delgado Martín A, Ferreira Borrego I, Álvarez Gil C, Plaza Arranz J

OBJETIVO: Evaluar la influencia del tipo de asa de diatermia en los márgenes de las conizaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de las piezas quirúrgicas de las 195 conizaciones realizadas en 2018 en el HUFJD. Estudio de:

- Extensión de la lesión
- Márgenes quirúrgicos
- Idoneidad de la pieza
- Grado de lesión histológica
- Primer control postcirugía



RESULTADOS:

- 100% de procedimientos en consulta y en régimen ambulatorio.

	Asa triangular (57,2%)	Asa Circular (42,8%)	p
Artefacto cauterio severo	2,7%	10%	P=0,03
Borde endocervical afecto	9,9%	28,9%	P<0,001
Algún borde afecto	31%	18%	P=0,04

- No hubo diferencias en la extensión de la lesión colposcópica, % valorable en la pieza, margen endocervical y control posterior.

CONCLUSIONES:

El uso del asa de diatermia circular está asociado a mayor artefacto de cauterio en la pieza quirúrgica, así como a un aumento de la tasa de márgenes globalmente afectados, a expensas del endocervical.

Cabe destacar que a pesar de los llamativos hallazgos, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al control a los 6 meses y la tasa de reintervención.

