

CO1-7

Título:	PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LAS MUJERES CON CITOLOGIA DE ASCUS Y DE LSIL
Autor-es:	Megía Baumela A, González Paredes A, Aguilar Romero T, Romero Guadix B, Torres García LM, Montoya Ventoso F.
Centro de trabajo:	Patología del Tracto Genital Inferior. Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Ciudad:	Granada
E-mail:	

Objetivo: Determinar los factores epidemiológicos de las mujeres con citología ASCUS y compararlos con las mujeres con citología LSIL

Material y Método: Estudio retrospectivo observacional de 384 mujeres derivadas a la consulta desde Agosto 2005 a Octubre de 2006. Se compara la epidemiología de las pacientes con citología ASCUS (141 pacientes) con los de aquellas con citología de LSIL (342 pacientes). Las variables analizadas fueron: edad, comienzo de relaciones sexuales, nivel socio-económico, consumo de alcohol, tabaco y drogas, anticoncepción, antecedentes de ETS, prurito y leucorrea y resultados citológicos en los dos años previos al diagnóstico.

Resultados: Se obtuvieron diferencias significativas en las siguientes variables:

	ASCUS	L-SIL	p		ASCUS	L-SIL	p
EDAD				ALCOHOL			
>35	67,0%	3,2%	<0,05	NO	51,7%	54,1%	NS
20-35	32,1%	47,3%	<0,05	ESPORADICO	41,1%	43,5%	NS
<20	0,9%	49,4%	<0,05	FRECUENTE	7,1%	2,4%	<0,05
NIVEL SOCIO- ECONOMICO				EDAD 1º COITO			
BAJO	56,6%	22,6%	<0,05	<18	48,2%	60,5%	<0,05
MEDIO	42,5%	73,3%	<0,05	>18	51,8%	39,4%	<0,05
ALTO	0,8%	3,9%	NS				
TABACO				CITOLOGÍA PREVIA			
SI	43,9%	10,9%	<0,05	NINGUNA	48,6%	34,9%	<0,05
NO	56,0%	89,1%	<0,05	NORMAL	36,7%	43,3%	NS
				SOSPECHOSA	14,7%	21,8%	NS

Las mujeres con resultado citológico de ASCUS tienen más de 35 años, sin citologías previas, de nivel socioeconómico bajo y fumadoras. Al contrario que las que presentan una citología de LSIL, que son más jóvenes, con un comienzo precoz de relaciones sexuales y mejor nivel socio-económico

Conclusiones: Las diferencias epidemiológicas observadas pueden explicarse por las distintas causas que desarrollan las alteraciones celulares. El LSIL incluye los cambios citopáticos por VPH, que suele infectar en las primeras relaciones sexuales, en edades más tempranas que el ASCUS. La intervención de factores ajenos al VPH (procesos inflamatorios, atrofia por déficit de estrógenos, cirugía, radioterapia, etc.) puede explicar la edad mas avanzada de las mujeres con citología de ASCUS.