

CO1-9

Título:	Citología AGUS: Prevalencia y significado patológico.
Autor-es:	G Soro, C Centeno, C Iglesias ¹ , N Tallada ¹ , J Martínez i Palones, J Xercavins.
Centro de trabajo:	Unidad de Oncología Ginecológica. Servicios de Ginecología y Citología ¹ . Hospital materno-infantil Vall d'Hebron. Universidad Autónoma Barcelona.
Ciudad:	Barcelona
E-mail:	gemsoro@yahoo.es
Objetivo:	Evaluar la prevalencia de AGUS y el diagnóstico anatomopatológico definitivo en pacientes que han presentado una citología AGUS.
Material y Método:	Estudio retrospectivo en el que se revisaron las historias clínicas de pacientes que habían presentado una citología AGUS entre Enero de 2000 y Agosto de 2006. Se incluyeron en el estudio aquellos casos que fueron seguidos por la Unidad de Patología Cervical.
Resultados:	De un total de 73.726 citologías realizadas, 41 (0.05%) fueron informadas como AGUS. 26 fueron incluidos en el estudio. En 14 se realizó detección de VPH, de los cuales 11 (78%) presentaron detección de VPH de alto riesgo y 3 (22%) de bajo riesgo. De las 26 pacientes con citología AGUS, en 9 (34.6%) el diagnóstico anatomopatológico final fue normal, en 2 (7,7%) de CIN I, en 4 (15,4%) de CINII-III, en 2 casos (7.7%) adenocarcinoma cervical in situ, en 3 (11.5%) adenocarcinoma cervical invasor, en 4 (15,4%) adenocarcinoma endometrial y 1 caso (3.8%) pólipo. La paciente restante no continuó control tras el diagnóstico de AGUS. Las edades de las patologías, con diagnóstico de normalidad, 8 eran < de 50 años y 1 ≥ 50 años. Entre las diagnosticadas de CIN1, una era <50 otra >50. En CIN2-3 las 4 pacientes eran <50 años. Los 2 casos de Adenocarcinoma in situ eran <50 años, los Adenocarcinoma invasores, 1 era <50 años y 2 >50 años, y las diagnosticadas de Adenocarcinoma endometrial, las 4 eran ≥50 años.
Conclusiones:	1).La prevalencia del AGUS en nuestro centro (0.05%) es menor que la de otras series publicadas. 2) La infección VPH es frecuente (100% de las que se realizó el test). 3). El AGUS está asociado a patología importante (50% presentaron CIN II o mayor). 4) Los adenocarcinomas invasores son más frecuentes en pacientes con edades ≥ a 50 años (66.7 vs 5,9%). 5) La patología endometrial apareció sólo en el grupo de pacientes > de 50 años.