

CO4-4

<b>Título:</b>	<b>ADENOCARCINOMA VILLOGLANDULAR Y EMBARAZO. UNA ASOCIACIÓN QUE INDUCE A UNA CONDUCTA CONSENSUADA Y DE DIFÍCIL DECISIÓN</b>
<b>Autor-es:</b>	N Devesa, J Inglada, L Yañez, P Suarez, L Carrizo
<b>Centro de trabajo:</b>	Servicio de Ginecología. Hospital de Figueres.
<b>Ciudad:</b>	Figueres (Gerona)
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:lucreciac@sego.es">lucreciac@sego.es</a> ; <a href="mailto:xlucreciax@hotmail.com">xlucreciax@hotmail.com</a>
<b>Objetivo:</b>	Presentación de un caso clínico muy poco frecuente.
<b>Material y Método:</b>	Paciente de 33 años con embarazo de 9,2 semanas que a especuloscopia se identifica una masa exofítica de 2 cm en labio anterior y 3 cm en labio posterior, friable y sangrante. El resultado anatomopatológico es: Adenocarcinoma villoglandular bien diferenciado.
<b>Resultados:</b>	Se realiza biopsia de corion y conización, cuyo resultado fue adenocarcinoma con 1mm de infiltración. Estadio Ia1. Tras controvertidos debates y examinando el caso de forma individualizada se decide que evolucione el embarazo de forma espontánea, produciéndose a las 40 semanas un parto eutócico. Después se completa el tratamiento con histerectomía radical tipo Wertheim-Meigs, nivel Piver II, no hallándose patología residual. En la actualidad la paciente presenta controles negativos para recidiva. Este tipo de tumor, poco frecuente, es de muy buen pronóstico, pero asociado a embarazo es el cuarto caso publicado en el mundo. Todos ellos evolucionaron en forma diferente, por lo que es muy difícil obtener conclusiones válidas. Por tal motivo en nuestro caso se tomó una conducta más radical luego de consensuar la misma en un comité multidisciplinario junto a un psico-oncólogo, terapeuta familiar, ginecólogos, anatómopatólogos y fundamentalmente la misma paciente y su entorno familiar.
<b>Conclusiones:</b>	Siendo una patología infrecuente y aún más asociada a embarazo, cuyas conductas diagnóstico-terapéuticas son invasivas y complejas, recomendamos individualizar el caso, otorgando fundamentalmente soporte desde el aspecto emocional para que la paciente forme parte de la decisión.