

CO5-12

Título:	VALOR DE LA DETERMINACIÓN DE VPH EN EL PRIMER CONTROL PRACTICADO AL TERCER MES POS-CONIZACIÓN
Autor-es:	Borja Rivero Torrejón, José Ramón Cortaberría Ibarlucea, Ainhoa Salegui, Ainoa Becerro Cortizas, Yurdana Aizpitarte, Marina Navarro.
Centro de trabajo:	Hospital Donostia.
Ciudad:	San Sebastián
E-mail:	brivero@chdo.osakidetza.net
Objetivo:	Conocer la utilidad de la determinación del HPV en el primer control tras conización efectuada en el tercer mes tras la conización.
Material y Método:	Recogemos todas las conizaciones practicadas en nuestro departamento entre el 1 de enero 2005 y el 30 de abril 2006 y el resultado de la determinación del VPH practicada en el primer control pos-conización, que se efectúa en el tercer mes tras la conización.
Resultados:	Se hizo conización a 130 pacientes y determinación VPH a 122. En 92 el resultado fue negativo, en 27 positivo y en 3 no valorable. De las 27 pacientes con VPH positivo en 4 se practicó una segunda conización con resultado histológico de CIN, en 4 histerectomía con patología en la pieza de histerectomía y en una paciente se evidenció una VAIN3. El resto de las pacientes continúan con controles.
Conclusiones:	La determinación VPH en el primer control tras la conización es altamente efectiva para orientar sobre la persistencia o la curación de la enfermedad.